




## OPTIMISER L'ORGANISATION DE L'ACCOUPEMENT

Avec un taux de fécondation de l'ordre de 85 à 90%, il est généralement aisé d'obtenir une gestation chez la chienne. Cependant, la fonction sexuelle du chien est soumise à des particularités physiologiques qui la distinguent des autres espèces. Ainsi, une erreur dans le choix du moment de la saillie se traduit souvent par la naissance de portées de taille réduite voire une absence de gestation.

Il peut donc être utile d'effectuer un suivi de chaleurs. Il consiste à réaliser des examens complémentaires afin de suivre le cycle ovarien et déterminer le moment optimal pour la saillie.

### COMMENT SE MANIFESTENT LES CHALEURS CHEZ LA CHIENNE ?

Chez la chienne, les chaleurs sont divisées en deux phases : le pro-œstrus et l'œstrus (figure).



Le pro-œstrus se manifeste par des pertes vulvaires sanguinolentes qui durent 9 jours en moyenne. Pendant cette période, la femelle attire les mâles mais refuse l'accouplement. Cette phase est suivie de l'œstrus, qui dure également en moyenne 9 jours. Pendant l'œstrus, les pertes sanguines diminuent, et la chienne change de comportement et accepte d'être saillie.

